

ŘEZ STROMŮ A KEŘŮ

KDY A JAK PROŘEZÁVAT OKRASNÉ KEŘE A STROMY?

K prořezávání okrasných listnatých stromů a keřů je, kromě letních měsíců - července a srpna, vhodné i období vegetačního klidu, teda celé zimní období, kdy teploty vzduchu neklesají pod -5°C . Optimálním termínem jsou měsíce únor, březen, ale i duben.

Volba termínu řezu okrasných keřů závisí jak na době kvetení, a to sice :

- keře kvetoucí v jarním období mohou být prořezány po jejich odkvětu, např. zlatice (*Forsythia*), kdy se odkvetlé výhony ustříhnou těsně až nad zemí, tím pádem má rostlina možnost nasadit v letním období dostatek nových, mladých výhonů; v následním roce se v předjaří tyto mladé výhony pouze o 1/4 délky zakrátí, aby mohli v témž roce vykvést a postup se opakuje - tzv. zpětný řez;

- keře kvetoucí v letním období jsou počas zimního prořezávání upraveny na 1/4 celkové velikosti, z důvodu vytvoření dostateku mladých kvetoucích výhonů, např. mochna (*Potentilla*), tavolník (*Spiraea*), ořechokřídlec (*Caryopteris*) ale i dalšího kompaktního růstu *Physocarpus* (tavole), *Buddleja* (komole), *Cornus alba* (svída), *Deutzia* (trojpek), *Lonicera* (zimolez)

tak na tvorbě květenství :

- keře kvetoucí v letním období mohou být prořezány po jejich odkvětu, např. vajgélie (*Weigela*), kolkvície (*Kolkwitzia*), kdy výhony se nevystříhují u země, ale pouze zakracují, nakolik tyto rostliny tvoří květenství pouze na starých výhonech; pokud se výhony ustříhnou těsně až nad zemí, má rostlina možnost nasadit dostatek nových, mladých výhonů, které se v dalších letech pouze zakracují aby mohli nasadit květy;

Zvláštní skupinu tvoří keře, které se prořezávají pouze výjimečně, z důvodu nedostatku prostoru, případně odstanění poškozených částí větví. Patří sem *Cornus kousa* a *Cornus florida* (dřín), *Magnolia* (magnólie), *Hamamelis* (vilín), *Acer palmatum* (javor dlanitolistý), většina stálezelených rostlin a pod.,

a polokeře, u kterých se s ohledem na jejich náchylnost na namrznutí provádí hlubší zakrácení pouze v předjarním období a v letním období udržovací řez, o 1/4 velikosti, případně o velikost odvetlých částí. Platí to pro levanduli (*Lavandula*), perovskii (*Perovskia*)

Pro udržovací řez okrasných listnatých stromů obecně platí odstranění pouze nemocných, poškozených a odumřelých větví. Radikálnější řez lze provést v případě nedostatku místa a při zachování tvaru dřeviny. Dtto i pro jehličnaté dřeviny (stromy i keře). Vše provádíme tak, aby nedošlo k narušení jejich přirozeného tvaru. Řez se provádí dle potřeby, jinak v předjarním období.

DŮLEŽITÉ !

Řez, kterékoliv části rostliny, musí být veden tak, aby vznikla co nejmenší rána. K řezu je vhodné použít ostré nářadí, aby nedošlo k roztřepení okrajů rány a kůry, ale i rozštěpení ponechaných částí větví. Řezné rány malého průměru není nutné ošetřovat, pro větší je optimální překrytí štěpařským voskem, stromovým balzámem, případně latexovou barvou.

Řezem podporujeme nejen výraznější kvetení, rovnoměrnější růst a dekorativnost dřevin, ale i jejich dokonalé využití světla, vzduchu a živin.